

**NUEVA
FORMULA**



USO EN MEDICINA VETERINARIA

Gasol
König

**EXTRA
FORTE**
ANTIESPUMANTE

VERDADERA
**ROMPE
LA BURBUJA**
SOLUCION

Solución preventiva y
curativa para bovinos

Cont. **600ml**
Hecho en Uruguay

Fórmula:

Diploioxetilato de polipropilenglicol eter
(poloxaleno) 94 g
Excipientes c.s.p. 100 g

Indicaciones:

Para la prevención y tratamiento del ampaste o meteorismo en bovinos, producido por la ingestión de leguminosas (alfalfa, tréboles, etc.).

Especies: Bovinos.

Dosis:

- **Tratamiento preventivo:**
10 ml cada 450 kg de peso vivo.
Administrar 24 hs antes del ingreso a pasturas de alto riesgo; completar la prevención con abundante agua de bebida y alimento fibroso.
- **Tratamiento curativo:**
25 ml cada 450 kg de peso vivo.

Restricciones de Uso:

- GASOL Extra Forte es atóxico.
- No deja residuos en leche o carne.
- No tiene tiempo de espera.

Vía de Administración:

Intramuminal con pistola dosificadora o jeringa y agujas adecuadas.

Lea el prospecto en su totalidad antes de usar el producto. Siga las instrucciones atentamente.

Conservar en lugar seco y fresco, entre 5° y 32° C

Nota: Laboratorios König no se responsabiliza por el uso indebido del producto.

Uso en Medicina Veterinaria.

En Uruguay: Reg. M.G.A.P.: A 3752
König Uruguay S.A. - Antonio Machado 1443,
Montevideo, Uruguay, Telex: 2208 3920 - 2203 0055
E-mail: direccion@koniglab.com
Dir. Téc.: Dr. Raúl Leites
Establecimiento elaborador autorizado.

En Argentina: Importado y distribuido por:
Laboratorios König S.A.

Av. B. Rivadavia 719 (B1868ACA) Avellaneda,
Bs. As. Dir. Téc.: Dr. O. Hortas, M.N. 3136

En Brasil: Representante no Brasil, Importador e
Distribuidor: **König do Brasil Ltda.** Estrada dos
Romeiros, km 38,5, Galpão G-5 Nº 184,
Condomínio Morro Grande, Santana de Parnaíba,
SP, CEP: 06500-000 Tel/Fax: 4154-4585
C.N.P.J.: 60.683.406/0001-48. Resp. Técnico: Dr. A.
de A. Prazeres Gonçalves. CRMV SP 10821

 **König**

Nº Serie:

Fecha de Fab.:


Vencimiento: 2 años a partir de la fecha de Fab.

GASOL EXTRA FORTE®

Manual de aplicación:

- 1) Especies destinadas: bovinos y ovinos.
- 2) Administración: se aplica vía intrarruminal, en el hueco del ijar (vacío) del lado izquierdo.
- 3) Instrumentos:
 - dosificadora o jeringas adecuadas para este tipo de tratamiento (de ser posible de 10 o 20 ml.)
 - agujas: un mínimo de dos o tres, las cuales deben tener un largo de 9 a 10 cm y un diámetro de 2 mm o 14 G.
 - recipiente para desinfección (metal o plástico).
 - desinfectante adecuado.
- 4) Instrucciones y recomendaciones para asegurarse la correcta y total dosificación dentro del rumen;
 - tratar de que los animales queden en el tubo apretados, de manera que no les permita moverse para adelante o atrás.
 - una vez frente al animal es conveniente hacer presión con el puño cerrado en el hueco del ijar (vacío) para una mejor ubicación del lugar de aplicación (dibujo 1).

Dibujo 1



Dibujo 2



Luego tomamos una de las agujas del recipiente con desinfectante y la introducimos. Corroboramos de que está efectivamente en el rumen por la salida de gas (dibujo 2).

Recién en este momento colocamos la jeringa con **GASOL EXTRA FORTE®** acoplándola a la aguja que tenemos ya introducida en el rumen.

- Hacemos la dosificación correspondiente:

Tratamiento preventivo 10 ml cada 450 kg. de peso vivo.

Tratamiento curativo 25 ml cada 450 kg. de peso vivo.

- Sacamos la jeringa y aguja, las separamos para dejar la aguja en el recipiente con desinfectante, tomamos otra aguja para el siguiente animal y seguimos los mismos pasos que enumeramos anteriormente.

5) Realizar la aplicación cada 15 días.

ADVERTENCIAS

Usar en animales con el rumen desarrollado.

Los animales deben beber abundante agua antes de la administración preventiva de **GASOL EXTRA FORTE®**. Deben pasar 24 hrs. de la aplicación para introducir a los animales a la pradera problema y es aconsejable que antes ingieran alimento fibroso (pastura natural o fardos).

CONTRAINDICACIONES

GASOL EXTRA FORTE® no es tóxico, no posee efectos colaterales ni tiene contraindicaciones.

Es compatible con otros tratamientos.

RECOMENDACIONES

- Vigilar los animales que consumen pasturas peligrosas; retirarlos de la misma ante la aparición de los primeros síntomas.
- Aumentar la carga animal para disminuir la selección, así se consume hojas y tallos por igual.
- No ingresar animales hambrientos a la pradera.
- Premarchitar la pradera para disminuir la humedad y la cantidad de sustancias meteorizantes. Este se puede realizar por medio mecánico (corte) o químico a través de herbicidas.

Conservar entre 5° C y 32° C.

Nota: El laboratorio no se hace responsable por el uso inadecuado del producto.

En Uruguay:

Reg. M.G.A.P. A 3752

König Uruguay S.A. - San Fructuoso 1169

Montevideo, Uruguay

Tel.: 2208 3920 - 2203 0055

Dir. Téc.: Dr. Raúl Leites