

Cicatrizante
Curabicheras

USO VETERINARIO

Indicaciones: Tratamiento preventivo y curativo de bicheras en todo tipo de heridas en las especies bovina, equina, ovina, caprina, porcina y canina; con propiedades larvicidas, antimicrobianas, hemostáticas y cicatrizantes. Puede utilizarse en animales de cualquier edad inclusive recién nacidos. Forma una película protectora que elimina el sangrado. Previene la miasis en los trabajos de rutina (cirugía, ombligo, descote, descome) gracias a su poder repelente. Bactrovet Plata AM es eficaz frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la sulfadiazina argéntica y larvas de moscas productoras de miasis: *Luxia* sp.; *Calliphora* sp.; *Cyllingia* sp. y *Sarcophaga* sp.

Aplicación: Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Colocar el envase a 10 cm del área a tratar y rociar uniformemente, asegurando la penetración del producto dentro de la herida. Aplicar también alrededor de la misma, formando un halo de 5 cm. En caso de bicheras profundas es necesario asegurarse la penetración del producto en las cavidades. El color plateado de la herida permite determinar qué animal ha sido tratado. En caso de miasis la aplicación se puede repetir diariamente hasta la curación. La duración del tratamiento depende del tipo de afección y de la complicación de la herida, se recomienda continuar la aplicación hasta lograr la cicatrización. El número de aplicaciones a realizar como preventivo dependerá del tipo de herida y de las condiciones ambientales. En la prevención de las bicheras del ombligo basta con una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En caso de herida de castración en grandes animales se recomiendan dos aplicaciones separadas por 72 horas.

Fórmula: Cada 100 g de concentrado contiene: sulfadiazina de plata 0,1 g; aluminio 5,0 g; DVP (acetato de 2,2-dimetil-4-(2,2-dicloro-4-vinil)1,6-g-openmetina (2,2-dimetil-3-(4,2,2-diclorovinil)-ciclopentil)carbodiato de aliciano-3-(fenobendolol) 0,4 g; excipientes c.s.a. 10,0 g

Propiedades: Butano. Relación concentrado /proporción: 22/78 p/p.

Precauciones: Producto tóxico. No fumar, comer ni beber durante su uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. Lavarse las manos después de su aplicación. Efectuar la aplicación en favor del viento para que no afecte al operador. Agitar varias veces el envase antes de aplicar. No arrojarse el envase al fuego. No perforar. No rellenar el envase. Si el producto contacta con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos deben lavarse profusamente con agua durante por lo menos 15 minutos y luego consultar al médico.

Síntomas de intoxicación: Excitación, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, miosis.

Para el control organofosforado DVP el antidoto es el suero de atropina al 1% v/v intramuscular. Repetir hasta la remisión de los síntomas.

La opimetina carece de antibiótico específico conocido. Si los síntomas difieren de los mencionados se deberá instaurar tratamiento sintomático.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Cap.: Hosp. de Clínicas (UBA), Tel.: 5950-8804-06; Hosp. de Niños "R. Gutiérrez", Tel.: 4962-2247/6666; Bs. As.: Cmo. Nac. de Intoxicac.: 0800-333-0160; La Plata: Cmo. de Atención Toxic.: (0221) 451-5555; Santa Fe: Sanat. de Niños, servicio de toxic., Tel.: (0341) 448-0202; Córdoba: Hosp. de Niños, Tel.: (0351) 458-6400/555; Mendoza: Cmo. de Inform. Toxic., Tel.: (0261) 425-0284/423-1123; Neuquén: Hosp. Centro Randon, Tel.: (0299) 449-0800; Tucumán: Hosp. del Niño Jesús, Tel.: (0381) 424-7083 Cmo. Nac. de Intoxicac.: 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. Ecuador: Cmo. de Control de Venenos Tel. (04)

bactrovet® plata AM

POLVO EN AEROSOL

Alto rendimiento

- anti-miásico • repelente
- bactericida • antifúngico
- cicatrizante • epitelizador
- hemostático • alta adherencia



Venta Libre (venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario). En Ecuador: Venta Bajo Receta.

Peso Neto: 146g
Contenido: 228ml / 9oz
Industria Argentina



256-0300. El Salvador: Hospital San Rafael Tel. 2525-5800 ext. 148 y 149. Guatemala: CIAT Tel. (502)22513560 (502) 2220755. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel. (507) 269-2741. Paraguay: Cmo. Nacional de toxicología 220-418, 294-800 (int. 1011). Perú: CIOTOX Tel. 0800-13040. República Dominicana: CIDT Tel. (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCC Tel. (212) 625-2586.

En Argentina:

■ SENASA Cert. Nº 86-463

■ Estab. Fab. Nº 8-596

Fabricado por **Brinto S.A.** Miéjico 1060, B1868BDF, Avellaneda, Buenos Aires y distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 739, B1868A00, Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 4208-4141, consultate@koninglab.com.ar. **Téc. Dr. Oscar Horas, Médico Veterinario, M. 3136.** **En Uruguay:** MGAP Nº 4746. Imp. y dist. por **König Uruguay S.A.** San Fructoso 1169, Montevideo, direccionecia@koninglab.com. Tel.: +598 22083920. **Dir. Tec. Dr. Raúl Lettes. En Bolivia:** SENASIG CR-PUV Nº 850/2005. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Piraí Nº 493, Santa Cruz, Tel. (09) 354-0251. **Dir. Tec. Ernesto Rojas V. En Ecuador:** Nº 183-281-9634-AGROCALIDAD. Imp. y dist. por **Ecosanquímica C.A.** Av. Ibañeta Km 1,5 entre Casas y Américas, Vía al Tiago, Quito, Tel. 022 861 6990. **Dir. Tec. Dr. Ismael Künze. En El Salvador:** Imp. y dist. por **SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A.** Bv. C.V. Edificio Alvarado, suite 5 01, Blvd. Luis poma, Sta. Elena, Antigua Cuscatlan, T. (503) 2505-5555/5565. **En Guatemala:** Reg. MAGA Nº xxx. **SUMINISTROS PORCHOS, S.A.** 3ª. Av. 41-40, zona 12 cd. Monte María I Centro empresarial Monte María, bodega 104. Tel. (502) 2479 1568/0066. **En Honduras:** Comerc. y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.** DE C.V. Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2365-6847. **Med. Reg. Dr. Abelardo Mejía Fariñas. Reg. Nº PF-4921.** **En Nicaragua:** Imp. y dist. **AGROVETERINARIOS S.A (Agrovets S.A.)** Gasolinera Plaza una cuadra sur y una cuadra al este. Jinotega, Carazo, Nicaragua. Tel.: +505 2332-3923 - 86004-2330. **Director técnico:** Dr. Orlando Francisco Acevedo Ortiz (MVD). **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. Nº 95-4939-48. Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.** Juan Diaz calle 1b, Tel. 507-2205231. distributive@eol.com.ni. **Reg. tec. Dr. Enilda Pinto Ito. 728. En Paraguay:** Imp. por **CRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021) 333-4027. Reg. SENASA Nº 5.222. RUC: 80014725-1. Reg. Alicia Escobar. Reg. Nº: 1882. **En Perú:** SENASA Reg. Nº E.27.30.1.0015 Comerc. por **GLOBALVET S.A.C.** Calle Mano Valdivia Nº 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima. (511) 719-0377. **En República Dominicana:** Ministerio de Agricultura Cert. Nº 8452/015. **Dir. FLEDERPAQUIS SRL.** Calle 16 de Agosto Nº11, Los porpires, Santiago de los Caballeros, Tel. (809) 241-3095/233-222. **En Venezuela:** Imp. por **Representaciones ADLCA, C.A.** Rif: J-3025110-0. MAT SASA Reg. M.I. 7031. Tel. 0241-871-601/7173-40, Valencia, Asesora Tec. Dra. Carmen Cavet M.V. CEJ 1007140278.

Agitar bien antes de usar

Conservar entre 4 y 35° C. En Perú conservar entre 15 y 30° C.
Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elaboración.
Lote y elaboración / vencimiento: Ver fondo del envase.
Establecimiento fraccionador: Ver fondo del envase.

CONTIENE UN CARGO DE 90 GRAMOS



MATERIAS PRIMAS IMPORTRADAS
EXCLUSIVA VALVULAS MULTIDIRECCIONALES QUE FACILITA EL MANEJO DEL ANIMAL



V3