Cebadilla NATIVA Bromus catharticus

- Bromus catharticus de rápida implantación con un 1er año muy explosivo
- Nativa tiende a superar la producción de las otras opciones presentes en el mercado, con excelente bianualidad.
- Su alta resiembra la hace una opción muy interesante para confeccionar pasturas de 2 y 3 años de duración.
- Su alta tolerancia a calor y sequía, la hacen una muy buena alternativa para siembras en suelos o zonas geográficas limitantes para Raigrases bianuales y perennes como lo es el Norte de Uruguay.

Producción anual y acumulada de gramineas bianuales						
Cultivar	Especie	1 ^{er} Año	2do Año	Total		
		2006-2007	2007-2008	KgMS/ha		
Nativa	Bromus	6946	6255	13201		
INIA Leona	Bromus	6936	6041	12977		
Martin Fierro	Bromus	6341	5954	12295		
Fuente: adaptado E	valuación Nacional de c	ultivares				

La cebadilla (Bromus catharticus) **Nativa** tiende a superar la producción de las otras opciones presentes en el mercado, presentando una excelente bianualidad que se le suma una alta resiembra natural. **Nativa** presenta rápida implantación que en condiciones normales permite un 1er pastoreo a los 60 días. Su capacidad de resiembra la hace una opción muy interesante para confeccionar pasturas bianuales y pasturas de 3 y hasta a 4 años de duración, las que presentan una producción inicial en el primer año de vida mayor a Festuca y Dactylis. Otro aspecto muy destacado es la alta tolerancia a calor y sequía, lo que la hacen una alternativa muy fuerte para pasturas de rotación corta en contraposición a raigrases bianuales y perennes, lo que es particularmente marcado al Norte del Rio Negro.

Implantación y manejo recomendado.

Se requiere suelos de buena fertilidad y buen drenaje. Muy poco tolerante al encharcamiento. Se implanta muy bien en siembra directa y se debe utilizar semilla curada contra carbón para tener una buena semillazón. Lo ideal es sembrarla temprano en otoño (desde marzo) utilizando densidades de 15 a 20 kgs/ha en mezcla con leguminosas y de 25 kgs/ha en siembra pura.

Su producción se maximiza con pastoreos rotativos, no muy intensos dejando un remanente de 5-8 cms. Su persistencia productiva en el segundo año requiere un alivio estratégico en el otoño para fortalecer las plantas sobrevivientes del verano y favorecer la re implantación por resiembra natural de semillas. Es muy palatable durante todo su ciclo.

Ideal para praderas intensivas de rotación corta en mezclas con Trébol rojo, Trébol blanco y Lotus. También puede utilizarse como gramínea complementaria para incorporar en praderas viejas que hayan perdido plantas para potenciar la misma por un par mas de años incorporando una gramínea de alta calidad nutricional recomendada para sistemas intensivos lecheros o de invernada.

Otra opción es como pastura pura con una producción intensiva durante 2 años (o mas por resiembra) en situaciones con alta presencia de malezas hoja ancha que se quieran controlar fácilmente en una pastura de gramínea pura. Es una excelente opción como gramínea acompañante de la Alfalfa mejorando el aporte invernal y balanceando la dieta. Muy buena opción para renovación de pasturas.