

Contiene cultivos puros y estabilizados de cepas seleccionadas de Bradyrhizobium específicas para Soja (Glycine max L. Merrill), en suspensión acuosa. Aditivos: adherentes, reguladores de pH, nutrientes y sustancias protectoras contra la deshidratación.

CONCENTRACIÓN MÍNIMA:

A la fecha de fabricación: 2.000 Millones (2 x 10⁹) de Bradyrhizobium / cc
A la fecha de vencimiento: 1.000 Millones (1 x 10⁹) de Bradyrhizobium / cc

DOSIS DE APLICACIÓN:

150 cc de inoculante NITRONAT "L" para 50 kgs. de semilla de soja. Para lograr una mejor cobertura y distribución sobre la semilla es aconsejable diluir la dosis en igual volumen de agua (150 cc), con lo que se obtiene un total de 300 cc para 50 kgs. de semilla.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN:

Agitar el envase antes de usar hasta observar la suspensión completa de los componentes.

Cuando la inoculación se realice en tandas o por bolsa, verter la dosis de aplicación sobre la semilla de soja distribuyéndola uniformemente. Remover la semilla hasta lograr su cobertura uniforme.

En el caso de usar equipos y sistemas de inoculación de flujo continuo, regular el volumen de aplicación del inoculante al flujo de semilla, con ayuda del tapón regulable que se adjunta al envase.

Dado que es aconsejable diluir la dosis en igual volumen de agua (150 cc de inoculante + 150 cc de agua=300 cc total para los 50 kgs. de semilla), se puede completar la bolsa con agua limpia hasta su capacidad máxima que es de 6 lts.

RECOMENDACIONES

- Verifique la fecha de vencimiento antes de usar.
- Una vez abierto el envase es conveniente usarlo dentro las 72 horas siguientes.
- Conservar el inoculante en lugar fresco, que no supere los 25°C.
- No exponer el inoculante ni la semilla inoculada al sol directo ni a temperaturas elevadas.
- Evitar la mezcla o el contacto con productos biocidas, bactericidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes o productos de reacción ácida o alcalina.
- En el caso que la semilla sea tratada con curasemillas:
 - Usar los curasemillas más compatibles con el inoculante.
 - Nunca realizar mezcla en un mismo recipiente del curasemilla y el inoculante.
 - Seguir la secuencia de aplicación sobre la semilla:
 1. Aplicar la dosis de curasemillas con el mínimo volumen de líquido compatible con su buena distribución.
 2. Aplicar la dosis de inoculante.
- En campos donde se realice el cultivo de soja por primera vez, se recomienda duplicar la dosis de inoculante líquido o usar inoculante en turba a dosis simple.

IMPORTANTE

Debido a la diversidad de condiciones de uso a la que puede ser sometido este producto, la garantía de calidad se limita al momento de ser entregado al comprador.

Producto controlado por el Departamento de Microbiología de Suelos y Control de Calidad de Inoculantes D.S.A. - RE.NA.RE. - M.G.A.P.

Registro de fabricante: 03

Registro de inoculante: 10

Contenido Mínimo: 3000 cc

INDUSTRIA URUGUAYA

LOTE:

VENCE: