

Mamyzin® Secado

Suspensión intramamaria

Descripción

Combinación antibiótica intramamaria de amplio espectro, para el tratamiento de mamitis durante el período de secado.

Características

Actividad antibacteriana de amplio espectro, sinérgica y bactericida.

Actúa selectivamente a lo largo del periodo de secado.

Liberación prolongada.

Beneficios

60 días de acción selectiva.

Alta curación de mamitis por estreptococos contagiosos.

Completa protección frente a gérmenes ambientales gram-positivos y gram-negativos

Ventajas

Seguro control de residuos.

Mayor potencia bactericida frente a estreptococos, estafilococos y coliformes.

Actividad antibacteriana selectiva.

Aplicación más higiénica.

Especies de destino

Bóvidos.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de mamitis producidas por estafilococos, estreptococos, coliformes, *Corynebacterium pyogenes* y *Pseudomonas aeruginosa* durante el período de secado.

Posología y administración

Administrar por vía intramamaria una jeringa por cuarterón. El tratamiento debe realizarse al inicio del período de secado, después del último ordeño. Antes de aplicar el producto, ordeñar a fondo y lavar externamente el cuarterón con una solución antiséptica. Tras aplicar el producto, dar masaje a la ubre para favorecer la distribución de la suspensión.

- El “Secado” a medida
- Composición antibiótica única
- Proporciona cobertura antibiótica selectiva durante todo el período seco

Precauciones

En caso de observarse cuarterones con mamitis clínica en el momento del secado, deben tratarse de modo adecuado antes de la aplicación de Mamyzin® Secado.

El tratamiento antimamítico debe acompañarse de medidas higiénicas y sanitarias que prevengan la reinfección.

Tiempo de espera

La leche de las vacas tratadas como mínimo 28 días antes del parto no debe ser destinada al consumo humano hasta transcurridas 84 horas del mismo.

Presentación

20 jeringas de 5 ml.



Mamyzin® Secado



Suspensión intramamaria

Composición

Cada jeringa de 5 ml contiene: 100 mg de penetamato iohidrato, 280 mg de penicilina benetamina y 100 mg de sulfato de framicitina, en suspensión oleosa estéril.

Propiedades

Mamyzin® Secado aporta, mediante sus tres principios activos, un amplio espectro de acción antibacteriana y garantiza una elevada actividad frente a todos los microorganismos relacionados con las mastitis bovinas: estafilococos, estreptococos, bacterias coliformes, *Corynebacterium pyogenes* y *Pseudomonas aeruginosa*.

El penetamato iohidrato es un éster de la bencilpenicilina que presenta importantes ventajas sobre las sales habituales empleadas de este antibiótico, ya que muestra una especial capacidad de difusión a través de las membranas celulares, asegurando una distribución rápida y uniforme por todo el tejido mamario. El penetamato iohidrato es efectivo contra los microorganismos gram positivos y sus propiedades de difusión le confieren especial valor en las mastitis estafilocócicas, pues otras penicilinas encuentran difícil acceso a los focos de infección dentro del tejido conectivo intersticial.

La penicilina benetamina y el sulfato de framicitina son dos antibióticos de acción prolongada. En ensayos realizados con vacas tratadas con Mamyzin® Secado se han observado concentraciones de penicilina en leche hasta 3 ó 4 semanas después de la aplicación y concentraciones terapéuticas de framicitina durante todo el período de secado.

En Mamyzin® Secado se combinan, en un solo preparado, las características de penetración y rápido efecto del penetamato iohidrato, con la acción prolongada de la penicilina benetamina y el sulfato de framicitina. Por ello, su aplicación al inicio del secado provoca una acción rápida y eficaz contra los microorganismos que se encuentran en la ubre antes de proceder al secado, al mismo tiempo que evita la aparición de nuevas infecciones durante este período.

Indicaciones

Mamyzin® Secado está indicado en vacas, durante el período de secado, para el tratamiento y prevención de mastitis producidas por estafilococos, estreptococos, coliformes, *Corynebacterium pyogenes* y *Pseudomonas aeruginosa*.

Contraindicaciones

No administrar a vacas en período de lactación, dado que la leche no podrá utilizarse para consumo humano durante un período prolongado de tiempo.

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas y/o a los aminoglucósidos.

Los animales con historial conocido de alergia a las cefalosporinas deben ser tratados con especial atención.

Efectos secundarios

Los animales deben someterse a una vigilancia estricta después de la administración, para tratar cualquier tipo de reacciones adversas. Los síntomas de hipersensibilidad y anafilaxia van desde reacciones cutáneas leves con urticaria y dermatitis hasta el shock anafiláctico grave con temblores, vómitos, hipersalivación, trastornos gastrointestinales y edema laríngeo.

En estos casos, se suprimirá la administración del medicamento y se administrará rápidamente adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides, oxígeno y/o aminofilina.

Posología y administración

Administrar por vía intramamaria una jeringa por cuarterón. El tratamiento debe realizarse al inicio del período de secado, después del último ordeño. Antes de aplicar el producto, ordeñar a fondo y lavar externamente el cuarterón con una solución antiséptica. Tras aplicar el producto, dar masaje a la ubre para favorecer la distribución de la suspensión.

Precauciones

No administrar en ningún caso por otras vías distintas a la indicada.

El tratamiento antimamítico debe acompañarse de medidas higiénicas y sanitarias que prevengan la reinfección.

En caso de observarse cuarterones con mastitis clínica en el momento del secado, deben tratarse de modo adecuado antes de la aplicación de Mamyzin® Secado.

Tiempo de espera

La leche de las vacas tratadas como mínimo 28 días antes del parto no debe ser destinada al consumo humano hasta transcurridas 84 horas del mismo.

Presentación

Caja con 20 jeringas de 5 ml.

Conservación

Mantener en lugar fresco (< 25°C), seco y al abrigo de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Prescripción veterinaria

Registro nº: 8104

Fabricado por

Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG
Heinz - Lohmann - Strasse 4
27472 Cuxhaven, Alemania

Titular

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, s/n
Sector Turó de Can Matas
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Boehringer Ingelheim España, S.A. - División Veterinaria

Prat de la Riba s/n - Sector Turó Can Matas - 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
www.boehringer-ingelheim.es/veterinaria - Tel. 934 045 250 - Fax. 934 045 345