



CALIMEC

Antiparasitario externo
Endectocida de amplio espectro

FORMA FARMACEÚTICA:
Injectable solution

COMPOSICIÓN:
Doramectina 1%
Agentes de formulación c.s.p. 100%



INDICACIONES:

Bovino:

- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido a nematodos gastrointestinales, gusanos redondos gastrointestinales (adulto y cuarto estadio de larvas): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Haemonchus similis*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia surnabada* (sin. memasteri), *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris discolor*. Lombriz del pulmón (adultos y cuarto estadio de larvas): *Dictyocaulus viviparus*.

- Ectoparásitos: Garrapata: *Boophilus microplus*; Parásitos del ojo: *Thelazia spp.*; Ura (estadios parasitarios): *Hypodrema bovis*, *Hypodrema lineatum*, *Dermatobia hominis*; Ayuda en el control de bicheras (miasis): estadios parasitarios: *Cochliomyia hominivorax*; Piojos: *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenoptes capillatus*, *Damalinea bovis*; Ayuda en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) por su acción sobre el ciclo parasitario; Sarna: *Psoroptes ovis*.

Ovino:

- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido a nematodos gastrointestinales, gusanos redondos gastrointestinales (adulto y cuarto estadio de larvas): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Haemonchus similis*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia surnabada* (sin. memasteri), *Nematodirus helvetianus*,

Nematodirus spathiger, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris discolor*. Lombriz del pulmón (adultos y cuarto estadio de larvas): *Dictyocaulus viviparus*.

- Ectoparásitos: Parásitos del ojo: *Thelazia spp.*; Ura (estadios parasitarios): *Dermatobia hominis*; Ayuda en el control de bicheras (miasis): estadios parasitarios: *Cochliomyia hominivorax*; Sarna: *Psoroptes ovis*; *Sarcoptes scabiei*.

Porcino:

- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido a nematodos gastrointestinales, gusanos redondos gastrointestinales (adulto y cuarto estadio de larvas): *Hyostrongylus rubidus*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* (adultos), *Oesophagostomum dentatum*, *Oesophagostomum quadrispinulatum*, *Trichuris suis*. Lombriz del pulmón (adultos): *Metastrongylus spp.* Lombriz del riñón: *Stephanurus dentatum*.

- Ectoparásitos: Piojos chupadores: *Haematopinus suis*; Ayuda en el control bicheras (miasis): estadios parasitarios: *Cochliomyia hominivorax*; Sarna: *Sarcoptes scabiei*.

POSOLOGÍA:

Bovino:

- Vía inyectable subcutánea o intramuscular a la dosis de 1 ml de Calimec cada 50 kg de peso vivo (200 mcg de Doramectina por kg de peso vivo).

- Para el uso contra garrapata del bovino en zona infestada (sucia), zona de erradicación y zona indemne, repetir la aplicación cada 21 días.

Ovino:

- Vía inyectable subcutánea o intramuscular a la dosis de 1 ml de Calimec cada 50 kg de peso vivo (200 mcg de Doramectina por kg de peso vivo).

ANTIPARASITIC



- En casos de Sarna Ovina, el tratamiento se repetirá a los 7 días de la primera aplicación.

Porcino:

- Vía inyectable intramuscular a las dosis de 1 ml de Calimec cada 33 kg de peso vivo (300 mcg de Doramectina por kg de peso vivo).

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a la doramectina. No usar en perros de la raza Collie y sus cruzas.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 35 días.

Leche: No administrar a vacas en período de lactación.

Producto de origen:

Uruguay

PRESENTACIÓN:

20 ml / 50 ml / 100 ml / 200 ml / 500 ml / 1000 ml.



LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY, S.A.

Camino Carrasco 6262

CP 11500 Montevideo - Uruguay

Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127

E-mail: laboratorios@calier.com.uy

www.calier.com.uy