



# CALIFLY PLUS

Antiparasitario de uso externo - mosquicida y piojicida para bovinos, porcinos y equinos

## Forma farmacéutica

Solución Pour-On

## Composición

Cipermetrina 6 g  
 Butóxido de Piperonilo 7 g  
 Carbaril 2 g  
 Excipientes c.s.p. 100 ml



## Indicaciones\*

Tratamiento de infestaciones de piojos, melófagos, moscas y mosquitos y en especial aquellas producidas por la "Mosca de los Cuernos" (*Haematobia irritans*), para la cual brinda una protección por 30 días o más.

Una de las principales ventajas de Calify Plus es su tiempo de espera en leche: Cero horas; esto permite no interrumpir el ordeño con lo cual se disminuyen las pérdidas por descarte de leche.

## Posología\*

Para el control de piojos, moscas y mosquitos:

Bovinos: 10 ml en animales de hasta 400 kg p.v. 20 ml en animales mayores a 400 kg p.v. Aplicar Pour-On en la línea media dorsal (para mayor efecto se puede aplicar la mitad de la dosis hasta el anca y el resto en los costillares con cánula lluvia).

Equinos: 20 ml, aplicar Pour-On en la línea media dorsal desde la cruz hasta el anca (10 ml) y 5 ml en cada ijar.

Porcinos: 10 ml, aplicar Pour-On en la línea media dorsal desde la cruz hasta el anca.

Aplicación: Calify Plus debe ser aplicado en forma tópica Pour-On, desde la cruz hasta la grupa.

## Contraindicaciones

Calify Plus es un producto tóxico, clasificado dentro de la categoría II (OMS). El producto debe ser manipulado con precaución, evitando su inhalación o el contacto directo con la piel. Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación. En caso de contacto accidental lavar la piel con abundante agua y jabón, si los ojos son afectados lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir al médico con el envase original.

Antídoto para el Ethion (Organofosforados): Sulfato de Atropina 1 %. No eliminar los envases en cursos de agua por ser tóxico para peces, no volver a utilizar los envases vacíos.

## Tiempo de espera\*

Carne: 6 días.  
 Leche: No aplica.

## Producto de origen

Uruguay

## Presentación

250 ml / 1 L / 3 L / 5 L

\* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.