Dactylis

Perseo (LE 12-41d)

- **Temprano, florece próximo al 7/10**
- **Hábito semierecto y color más oscuro que INIA LE Oberón**
- **Buena sanidad foliar**
- **Rendimientos mayores que INIA LE Oberón a partir del segundo año**
- **Se destaca sobre INIA LE Oberón en primavera, verano y otoño**
- **Alta producción de semillas**

Perseo (*Dactylis glomerata*) fue obtenido en La Estanzuela luego de tres ciclos de selección con énfasis en rendimiento y sanidad.

Perseo se destaca de la mayoría de los cultivares del mercado por su floración temprana, encaña 16 días antes que INIA LE Oberón. Es de hábito semierecto y color más oscuro que INIA LE Oberón.

Ha presentado muy buenos rendimientos en los ensayos de Evaluación Nacional de Cultivares INASE-INIA ocupando siempre los primeros lugares.

Rendimientos de forraje relativos a Porto

	1º año	2º año	3º año	Total
Perseo	105	105	109	105
INIA LE Oberón	107	104	102	103
Porto	100	100	100	100
100 = kg MS/ha	6634	9460	5726	21850

Fuente: Evaluación Nacional de Cultivares INASE-INIA, siembras 2004 y 2006.

En producción estacional de forraje se destaca netamente de INIA LE Oberón por su mayor producción de verano y otoño**.**

Producción estacional relativa a INIA LE Oberón en el segundo año

	Otoño	Invierno	Primavera	Verano
Perseo	105	93	102	111
INIA LE Oberón	100	100	100	100

Fuente: Evaluación Nacional de Cultivares INASE-INIA e INIA, promedio de 6 ensayos, 2004-2006.

Tiene buena sanidad foliar, aspecto muy destacable en materiales de floración temprana, que son generalmente los más susceptibles.



Fuente: J. García, INIA, promedio años 2004-2007.

Implantación y manejo

Se adapta a un amplio rango de suelos desde arenosos a pesados aunque su mejor performance se obtiene en suelos de texturas medias y permeables. Es poco tolerante a excesos hídricos por lo que no debe utilizarse en suelos húmedos mal drenados. Tiene buena resistencia a la sequía y en veranos secos se destaca netamente de las otras gramíneas perennes. Es menos exigente en fertilidad y humedad que festuca y raigrás perenne.

Requiere siembra superficial (0.5-1 cm) y se utilizan densidades de 6-10 kg/ha en mezclas con leguminosas. Se asocia muy bien con alfalfa, trébol rojo, trébol blanco y lotus. Tolera muy bien la sombra y admite siembras asociadas con cereales y otras gramíneas.

Su mayor rendimiento se obtiene con pastoreo rotativo no muy intenso dejando rastrojos de 5 cm. Pastoreos continuos e intensos especialmente en verano reducen su persistencia.

En otoño se debe permitir que la pastura crezca y reponga reservas. Se deben evitar los manejos aliviados que forman matas que se endurecen, especialmente en primavera durante la encañazón. Es más susceptible que festuca al daño por pisoteo.

Uso recomendado

Indicada para mezclas de praderas de larga duración especialmente en aquellos suelos de menor potencial y fertilidad relativa. Su forraje de buena calidad, alto tenor proteico y palatable es muy apto para producción de leche e invernada. Por su resistencia a la sequía y capacidad de crecer en verano es una opción muy apropiada para situaciones donde la competencia de especies estivales (gramilla, etc) puede ser un problema. En estos casos, los estudios de La Estanzuela indican que las praderas con dactylis se engramillan menos.

Status varietal: cultivar protegido.
Licenciatario: PROCAMPO URUGUAY SRL-SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL DE TARARIRAS.