

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: Cimbra es un herbicida selectivo de post emergencia, recomendado para el control de malezas de hoja ancha en cereales y alfalfa, siembras de gramíneas asociadas con leguminosas y ajo. Actúa inhibiendo el fotosistema II, donde se realiza la fotooxidación en la fotosíntesis, por lo tanto los primeros síntomas ocasionados en las malezas son la clorosis.

CULTIVO	INSTRUCCIONES DE USO		DOSIS (L/Ha)	
	MALEZAS			
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
AVENA	Senecio	<i>Senecio madagascariensis</i>	1,2 – 1,5	
	Manzanilla	<i>Anthemis cotula</i>		
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus quitensis</i>		
	Mastuerzo	<i>Coronopus didymus</i>		
	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>		
	CEBADA	Sanguinaria		<i>Polygonum aviculare</i>
		Enredadera anual		<i>Polygonum convolvulus</i>
	ALFALFA	Verdolaga		<i>Portulaca oleracea</i>
		Rábano		<i>Rapistrum rugosum</i>
	AJO	Cardo negro		<i>Cirsium vulgare</i>
Cardo ruso		<i>Carduus nutans</i>		
Flor morada		<i>Echium plantagineum</i>		
	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>		

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA, ELIMINAR LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN PARA CADA COMBINACIÓN: En Avena, Cebada y Trigo: Aplicar desde que el cultivo tiene tres hojas hasta el final del macollaje. En Alfalfa, Siembras asociadas de gramíneas con leguminosas forrajeras y en Ajo: Aplicar después que las leguminosas y el ajo hayan alcanzado el estado de hojas verdaderas y las gramíneas tengan como mínimo tres hojas. Las malezas deben estar en estadios iniciales de desarrollo para que el control sea efectivo.

NÚMERO, FRECUENCIA O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES: Generalmente se realiza una sola aplicación por temporada.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: En caso de mezclar con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitocompatibilidad en pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

TIEMPO DE ESPERA: No corresponde

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando como mínimo transcurrir 24 hs.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador en funcionamiento agregar la cantidad indicada del producto y completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. El producto puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización terrestre o aéreo. En aplicaciones terrestres utilizar boquillas abanico plano, buscando una cobertura total y uniforme del área a tratar, para lo cual se debe lograr aplicar 30-40 gotas/cm². Regular la máquina para un gasto de caldo 100 a 200 L/Ha. En aplicaciones aéreas utilizar boquillas tipo abanico plano o atomizadores rotativos, utilizando un volumen total de caldo de 30 a 40 L/Ha.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, centro poblado e instituciones educativas. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana, centro poblado e instituciones educativas. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.



2369 05 03

HERBICIDA

Cimbra

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente activo (ISO)	Porcentaje en peso (% p/p)	Contenido en volumen (g/l)
BROMOXINIL OCTANOATO	31,0	328
Equivalente en Bromoxinilo	22,5	238

Grupo químico: HIDROXIBENZONITRILLO**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO, (PCS/OMS,2009).

ANTIDOTOS: No tiene antídoto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **INGESTIÓN:** Provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de **CONTACTO CON LA PIEL,** lavado de las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de **INHALACIÓN,** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto. Consultar al C.I.A.T. (Hospital de clínicas, 7º piso) Teléfono (2) 1722.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEEAS: Ecotoxicología: Para AVES, moderadamente tóxico. Para PECES, ligeramente tóxico. Para ABEEAS, virtualmente no tóxico.

*Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de

degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.*

No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase, realice el triple lavado del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina aplicadora. Luego perfere el envase para impedir su reutilización y lávelo al centro de acopio más cercano.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar alejado de los recintos usados como vivienda, almacenamiento de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "**Cuidado-veneno**" (calavera). En caso de derrame recoger con tierra y/o aserrín para absorción de la sustancia, luego de juntarla, tirarla en el lugar de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros cultivos. No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722".

"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

ORIGEN: URUGUAY

Número del fabricante o formulador:

PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300. Juanicó, Canelones.

Tel:(598)4335 9662 – (598)4335 9775.

administracionjuanico@proquimur.com.uy

FIRMA REGISTRANTE:

PROQUIMUR S.A.

Ruta N° 5 Km 35,300

Juanicó, Canelones, Uruguay.

Tel. 43359662

N° LOTE:

Fecha de

Fabricación:

Fecha de

Vencimiento:

CONTENIDO

NETO:

5 Litros

VER EN EL
HOMBRO
DEL ENVASE

proquimur



NOCIVO



2369 05 03