



10 de marzo de 2020.-

|           |                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórm. 235 | <b><u>ETIQUETA APROBADA</u></b><br><b><u>De Producto Fitosanitario*</u></b>                                                                                   |
|           | Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.- |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |
| Nombre comercial: <b>Premierlin 600 CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |
| Clase de uso (aptitud): Herbicida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                       |
| Tipo de la formulación: Concentrado emulsionable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |
| Composición del producto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                       |
| Nombre común del ingrediente activo: (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje en peso: | Contenido en volumen: |
| <b>Trifluralina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>54,7 %</b>       | <b>600 g/L</b>        |
| Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Dinitroanilinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                       |
| Número de Registro: <b>2067</b> Declaro que estará impreso en la etiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                       |
| Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                       |
| Fecha de fabricación del producto: Declaro que estará impreso en la etiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |
| Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |
| Nombre del fabricante o formulador: ADAMA BRASIL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |
| País de origen: Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| Nombre y dirección de la firma registrante: Lanafil S.A.<br>Bvar. Artigas 420, Of. 105. Montevideo, Uruguay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)". PRODUCTO INFLAMABLE. |                     |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B RECOMENDACIONES DE USO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:</u></b> PREMIERLIN 600 CE es un herbicida selectivo que actúa impidiendo la germinación de las semillas de las malezas citadas en esta etiqueta. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la división celular ya que interrumpe la mitosis. Se aplica en preemergencia de las malezas y no requiere incorporación al suelo. Es de baja solubilidad en el suelo, presenta baja volatilización y resiste la descomposición por acción de la luz debido a su formulación especial. Resulta muy adecuado para usar en cultivos que requieren |



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

trasplante ya que no tiene ninguna acción sobre plantines o cualquier planta ya emergida. La selectividad puede ser fisiológica y/o posicional, en este último caso dado por la profundidad de siembra.

Instrucciones de uso:

| Cultivo                                                                                         | Malezas             |                               | Dosis<br>(L/ha) | Momento de<br>aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                                 | Nombre Común        | Nombre Científico             |                 |                          |
| Girasol<br>( <i>Helianthus annuus</i> L.)                                                       | Pasto blanco        | <i>Digitaria sanguinalis</i>  | 3 a 4           | Sembrar y<br>aplicar.    |
| Colza ( <i>Brassica napus</i> L. var. <i>Napus</i> );<br>Carinata ( <i>Brassica carinata</i> ); | Capin del arroz     | <i>Echinochloa crus-galli</i> |                 |                          |
| Algodón<br>( <i>Gossypium hirsutum</i> L.)                                                      | Braquiaria          | <i>Brachiaria platiphylla</i> |                 |                          |
| Soja ( <i>Glycine max</i> L.)                                                                   | Cola de zorro       | <i>Setaria geniculata</i>     |                 |                          |
| Maní ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)                                                              | Raigrás             | <i>Lolium multiflorum</i>     |                 |                          |
|                                                                                                 | Cebadilla           | <i>Bromus unioloides</i>      |                 |                          |
| Arveja ( <i>Pisum sativum</i> L.)                                                               | Pastito de invierno | <i>Poa annua</i>              | 3 a 4           | Sembrar y<br>aplicar.    |
| Lentejas ( <i>Lens culinaris</i> Medik.)                                                        | Enredadera anual    | <i>Polygonum convolvulus</i>  |                 |                          |
| Poroto<br>( <i>Phaseolus vulgaris</i> )                                                         | Roseta              | <i>Cenchrus echinatus</i>     |                 |                          |
| Habas ( <i>Vicia faba</i> L.)                                                                   | Yuyo Colorado       | <i>Amaranthus quitensis</i>   |                 |                          |
| Garbanzo<br>( <i>Cicer arietinum</i> L.)                                                        | Quinoa              | <i>Chenopodium album</i>      |                 |                          |
| Coliflor<br>( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i> L.)                                 | Verdolaga           | <i>Portulaca oleracea</i>     |                 |                          |
| Nabo ( <i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>Rapa</i> )                                             | Capiqui             | <i>Stellaria media</i>        |                 |                          |
| Repollo<br>( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Capitata</i> L.)                                  | Ortiga              | <i>Urtica urens</i>           |                 |                          |
| Apio ( <i>Apium graveolens</i> L.)                                                              | Sanguinaria         | <i>Polygonum aviculare</i>    |                 |                          |
| Perejil<br>( <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.))                                               | Spergula            | <i>Spergula arvensis</i>      |                 |                          |



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

|                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                  |       |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fuss</i> )<br>Zanahoria<br>( <i>Daucus carota</i><br>L.)<br>Lechuga<br>( <i>Lactuca sativa</i><br>L.)                                                                         | Cola de zorro<br><br>Sorgo de Alepo<br><br>Cardo ruso<br>Cardo negro | <i>Setaria geniculata</i><br><br><i>Sorghum halepense</i><br><br><i>Carduus nutans</i><br><i>Cirsium vulgare</i> |       |                                                                                                                                  |
| Tomate<br>( <i>Solanum lycopersicum</i> L.)<br>Morrón<br>( <i>Capsicum annuum</i> L.)<br>Berenjena<br>( <i>Solanum melongena</i> L.)                                             |                                                                      |                                                                                                                  | 3 a 4 | Aplicar inmediatamente antes de trasplante.                                                                                      |
| Ajo ( <i>Allium sativum</i> L.)<br>Cebolla ( <i>Allium cepa</i> L.)<br>Puerro ( <i>Allium ampeloprasum</i> var. <i>Porrum</i> )<br>Boniato<br>( <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam) |                                                                      |                                                                                                                  | 3 a 4 | Aplicar antes o después de trasplante.                                                                                           |
| Eucaliptus<br>( <i>Eucalyptus</i> spp.)                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                  | 3 a 4 | Aplicar pre o post trasplante.                                                                                                   |
| Caña de azúcar<br>( <i>Saccharum officinarum</i> L.)                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  | 3 a 4 | En caña-planta, aplicar luego de plantar. En caña-soca, aplicar luego de la cosecha y después de la labor de cultivo.            |
| Maíz ( <i>Zea mays</i> L.)                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                  | 3 a 4 | Asegurar una profundidad mínima de siembra de 5 cm para evitar el contacto del producto con la semilla. Selectividad posicional. |

**Observaciones:** Las dosis menores se recomiendan para suelos livianos. Las dosis altas se recomiendan para suelos pesados o con más de 5% de materia orgánica.



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

**PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:**

**SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.**

Momento de aplicación: ver cuadro.

Número y frecuencia de aplicaciones: una sola aplicación por temporada.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Compatible en mezcla de tanque con otros herbicidas normalmente usados en los cultivos recomendados. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: 30 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando trascorrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Agite bien el contenido del envase antes de usar el producto. Medir la cantidad requerida de producto y verter en el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad. Luego, con los agitadores en marcha, completar el llenado. Para las aplicaciones terrestres utilizar al menos 200 litros de caldo por hectárea.

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

**C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2009



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

**Antídotos:** No tiene antídoto.

**Primeros auxilios:**

En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada de inmediato lavar las zonas afectadas con abundante agua fresca o agua y jabón neutro. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarlas. En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado.

**En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.**



**COLOR VERDE**

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** No transportar ni almacenar con alimentos, utensilios domésticos y vestimentas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos, lavarse previamente las manos. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Utilizar los equipos de protección indicados para la aplicación y carga de la pulverizadora. Evitar la ingestión accidental del producto y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar respirar la neblina de pulverización. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. No trabajar con fuerte viento y evitar corrientes de aire donde se está pulverizando. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del manipuleo y aplicación, así como también la ropa utilizada. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:**

**A) MEDIDAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**Aplicaciones foliares**

- No producir deriva. Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones. No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

- peligro de contaminación de fuentes de agua
- La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas.
  - Situaciones climáticas que aumenten las posibilidades de ocurrencia. La Empresa aplicadora es la responsable por los daños que se produzcan.

**B) PELIGROSIDAD**

Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO

Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO

Toxicidad para peces: EXTREMADAMENTE TÓXICO

**Medidas de mitigación:**

Aplicaciones foliares

No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorecen la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 h de aplicación) o deriva del producto

Prohibida la aplicación a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 m en aplicaciones terrestres y 30 m en aplicaciones aéreas

Evitar la aplicación en surcos de erosión, desagües o áreas que descargan escorrentía en cuerpos de agua adyacentes.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Una vez que el envase esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano.

**D | LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA**

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".**

**"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722".**

**"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".**

**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".**

**"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".**

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

**"USO AGRICOLA"**

**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".**



## NOTA

### Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

| Tipo     | Capacidad               | Material                             |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|
| Botellas | 1 L                     | Polietileno de alta densidad         |
| Bidones  | 5 – 10 – 15 – 20 – 25 L | Polietileno de alta densidad o chapa |
| Bidones  | 50 – 100 – 200 L        | Polietileno de alta densidad o chapa |

## E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

| Apellidos y nombres completos (1) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |

(1) *Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

| Apellidos y nombres completos (2) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |

(2) *Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

| Apellidos y nombres completos (3) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |