



Dirección General de Servicios Agrícolas
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
República Oriental del Uruguay
 Av. Millán 4703, Montevideo. CP 12.900
 Telefono.: (0598-2) 309.84 10
 Web: <http://www.mgap.gub.uy>

9 de junio de 2016.-

Fórm. 235	<u>ETIQUETA APROBADA</u> <u>De Producto Fitosanitario*</u> Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-
------------------	--

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: ZETHAPYR 700 WDG		
Clase de uso (aptitud): Herbicida		
Tipo de la formulación: GRANULADO DISPERSABLE		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	En volumen
Imazethapyr	70 %	---
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Imidazolinonas		
Número de Registro: 3918 Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Fecha de fabricación del producto: Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Fecha de vencimiento: Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Nombre del fabricante o formulador: NINGBO SUNJOY AGROSCIECE CO.,LTD.		
País de origen: China		
Contenido neto: Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Nombre y dirección de la firma registrante: LANAFIL SA J.C. Gomez 1492 Piso 1 - Montevideo Teléfono 2916 19 32		
Instrucciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, semillas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "CUIDADO- VENENO" (dibujo de una calavera)		

B RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES: ZETHAPYR 700 WDG es un herbicida del grupo de las imidazolinonas que se usa en pre y post – emergencia en el cultivo de soja y alfalfa para el control de las malezas de hoja ancha y gramíneas que se indican en esta etiqueta. ZETHAPYR 700 WDG es absorbido por las hojas y las raíces de las malezas y trasladado vía floema y xilema al resto de la planta interfiriendo en la síntesis de aminoácidos de alifáticos, provocando necrosis y muerte de las mismas.

Instrucciones de uso:

Cultivo	MALEZAS CONTROLADAS	Tipo de tratamiento	Dosis	Momento de aplicación
SOJA	Yuyo Colorado- <i>Amaranthus quitensis</i> Quinoa - <i>Chenopodium album</i> Verdolaga- <i>Portulacca oleracea</i> Tutía- <i>Solanum sisymbriifolium</i> Chamico- <i>Datura ferox</i> Chinchilla- <i>Tagetes minuta</i> Abrojo- <i>Xanthium cavanillesii</i> Malva- <i>Anoda cristata</i>	Tratamiento único	140 gr/ há.	
		Tratamiento en dos veces	70 gr/há.	Pre-siembra incorporado
	+ 70 gr/ há.		Post-emergencia temprana (#)	
ALFALFA	Enredadera- <i>Ipomoea grandifolia</i> Capín- <i>Echinochloa crus- galli</i> Pasto blanco- <i>Digitaria sanguinalis</i> Sorgo de Alepo- <i>Sorghum halepense</i> Pata de gallina- <i>Eleusine indica</i> Roseta- <i>Cenchrus echinatus</i> Girasol guacho- <i>Helianthus annus</i>		140 gr/há.	Desde la segunda hoja verdadera.

(#) cuando se aplica en pre-emergencia agregar un surfactante no-iónico.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:

SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTES MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

MOMENTO DE APLICACION:

En soja: Como pre-emergente (en cultivo convencional o en siembra directa), ZETHAPYR 700 WDG puede ser aplicado:

- antes de sembrar,
- en el momento de la siembra
- después de la siembra.

Como post emergente temprano, debe aplicarse con malezas de hasta 7 cm. de altura.

En alfalfa: Desde la segunda hoja verdadera trifoliada

NÚMERO Y FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES: Una sola vez por ciclo de cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: En soja, ZETHAPYR 700 WDG puede ser aplicado en mezcla de tanque con otros herbicidas autorizados para ese cultivo.

Corrosivo al Zinc, bronce, cobre, aluminio.

En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación.

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Disposición final de envases.-

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.-Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: 1722".

"CONCURREN AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

"USO AGRICOLA"

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

NOTA:

Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad.

El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo	Contenido	Material
Bolsas	50 – 100 – 250 – 400 – 500 g.	Plásticas aluminizadas
Bolsas	1 - 5 – 10 – 15 – 20 – 25 kg	Plásticas resistentes

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Renovación del producto **ZETHAPYR 700 WDG**

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) *Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) *Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma