

29 de julio de 2016.-

Fórm. 235	<u>ETIQUETA APROBADA</u> <u>De Producto Fitosanitario*</u> Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-
------------------	---

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: TRIBUNE 70 WG		
Aptitud: Herbicida		
Tipo de la formulación: GRANULADO DISPERSABLE		
Composición del producto:		
ingrediente activo:	en peso:	
Metribuzin	70 %	
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Triazinonas		
Número de Registro: 3321 Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Fecha de fabricación del producto : Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Fecha de vencimiento : Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Nombre del fabricante : AGAN CHEMICALS MANUFACTURERS LTD.		
País de origen: ISRAEL		
Nombre y dirección de la firma registrante: LANAFIL SA Juan Carlos Gómez 1492 Piso 1 Montevideo- Uruguay		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado en lugar fresco, seco y seguro (bajo llave).El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros similares .Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "CUIDADO – VENENO" (calavera). MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERIMENTADAS NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS:		

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES: TRIBUNE 70 WG es un herbicida, del grupo de las triazinas, que actúa inhibiendo la fotosíntesis y es selectivo posicional en el suelo. Es usado para el control pre-emergente o post-emergente temprano de las malezas, en los cultivos que se especifican en la etiqueta y su residualidad es dependiente del pH del suelo. TRIBUNE 70 WG es absorbido por las raíces y las primeras hojas, para provocar la inhibición de la fotosíntesis, por lo que es fundamental un buen contenido de humedad en el suelo.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	USO Y EPOCA DE APLICACIÓN	SUELO	DOSIS (kg/há)
PAPA	Pre-emergencia Post-emergencia: (hasta 10 cm de altura).		0,5 a 0,65 0,5
TOMATE	DE SIEMBRA DIRECTA: Pre-emergencia Post-emergencia (4 a 6 hojas) DE TRANSPLANTE. 7 a 10 días post-transplante.		0,3 0,45 0,45 – 0,65
BONIATO	ALMACIGO: antes de emergencia En CULTIVO: - pre-transplante - 10 días después del trasplante		0,3 a 0,45 0,45 a 0,65 0,3 a 0,45
ZANAHORIA	Post-emergencia (con más de 3 hojas verdaderas)	liviano medio	0,25 a 0,65 0,3 a 0,8
SOJA	Pre-emergencia: solo Pre-emergencia: en mezcla con Alanex a 3 lts/há Pre-siembra incorporado: en mezcla Triflurex a 1.5 lts/há		0,65 a 0,8 0,4 0,4
ARVEJA	Pre-emergencia Post-emergencia		0,45 0,25
ALFALFA	Luego del corte, durante el reposo vegetativo, con plantas de más de 1 año.	suelo liviano suelo pesado	0,65 a 0,85 0,8 a 1,0
CAÑA DE AZUCAR	En caña-planta o caña-soca	medio pesado	1,3 2,0

MALEZAS CONTROLADAS	
N. COMUN	N. CIENTIFICO
Capiquí	Stellaria media
Cerraja	Sonchus oleraceus
Diente de León	Taraxacum officinale
Falsa viznaga	Ammi majus
Manzanilla	Anthemis cotula
Llantén	Plantago lanceolata
Raigrás	Lolium multiflorum
Yuyo cenizo	Chenopodium album
Verdolaga	Portulacca oleracea
Nabo	Brassica campestris
Mastuerzo	Coronopus didymus
Yuyo colorado	Amaranthus quitensis
Bolsa de pastor	Capsella bursa pastori
Pasto de invierno	Poa annua
Mostaza	Sinopsis arvensis

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:

SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN , PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

Frecuencia de las aplicaciones: Aplicar solo una vez por año o ciclo de cultivo

Contraindicaciones: No tiene.

Compatibilidad y fitotoxicidad
En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.-

Tiempo de espera para cosecha:	Papa, tomate, boniato, zanahoria:	60 días.
	Arveja:	40 días.
	Alfalfa:	30 días.
	Caña de azúcar:	120 días

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24hs.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Aplicar diluido en agua. Verter la cantidad necesaria de TRIBUNE 70 WG en el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad y, con los agitadores funcionando, completar su llenado.

No efectuar el llenado con agua de las maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.-

Se puede aplicar con equipos terrestres usando boquillas de abanico plano y un volumen de caldo superior a 180 L/há.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)~

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS/2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.

Contacto con los ojos .- Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

Contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar.

En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Franja de color_ AMARILLO



Precauciones_ para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.-No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.- Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.- Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.- No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.-

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:
AVES: MODERADAMENTE TOXICO
PECES: LIGERAMENTE TOXICO
ABEJAS: LIGERAMENTE TOXICO *“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”*

.No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación No pulverizar contra el viento y evitar la deriva

Disposición final de envases.-
Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.- Luego perfora el envase para evitar su reutilización.

LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.

“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL:1722”.

“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES

DE AGUA”.
PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
“USO AGRICOLA”
“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.

Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad.
El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados por el uso o el almacenamiento de este producto, ya que los mismos escapan a su control directo.

NOTA Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.

Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo	Capacidad	Material
Bolsas	0.5 – 1. – 5 – 10 – 15 – 20 kg	Plástico aluminizado
Tarrinas	– 1. – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 kg	Plástico resistente

FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

TRIBUNE 70 WG

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) *Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) *Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma