



15 de junio de 2017.-

.Fórm. 235	Etiqueta APROBADA De Producto Fitosanitario* Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-
-----------------------	---

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: NEXXO		
Clase de uso (aptitud): Herbicida		
Tipo de la formulación: Concentrado Emulsionable		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Pinoxaden	5 % p/p	50 g/L
Cloquintocet-mexil	1.25 % p/p	12.5 g/L
Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Fenilpirazol		
Número de Registro: 4823 Declaro que estará indicado en la etiqueta		
Número del lote o partida: Declaro que estará indicado en la etiqueta		
Fecha de fabricación del producto: Declaro que estará indicado en la etiqueta		
Fecha de vencimiento: Declaro que estará indicado en la etiqueta		
Nombre del fabricante o formulador: Sinochem Ningbo Ltd. y Proquimur S.A.		
País de origen: CHINA y URUGUAY		
Nombre y dirección de la firma registrante: PROQUIMUR S.A Ruta 5 Km 35,300, Canelones, Uruguay. Teléfono: 43359662		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno" (calavera). En caso de derrame recoger con tierra y/o aserrín para absorción de la sustancia, luego de juntarla, tirarla en el lugar de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros cultivos.		

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: NEXXO es un herbicida de post-emergencia selectivo para trigo y cebada. Actúa inhibiendo la enzima Acetyl-CoA-Carboxilasa (ACCase), interrumpiendo la síntesis de ácidos grasos a nivel del cloroplasto y la síntesis de lípidos a nivel del citoplasma. Esto hace que Nexxo tenga un excelente control de raigrás y balango.

Nexxo es absorbido por las hojas y traslocado hacia los puntos de crecimiento donde ejerce su acción inhibitoria sobre las malezas. Para ejercer su acción las malezas deben estar en activo crecimiento.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Maleza		Dosis	MOMENTO DE APLICACION
	Nombre Común	Nombre Científico		
TRIGO CEBADA	Balango	<i>Avena fatua</i>	600 – 800 cc/ha	Estado de desarrollo del cultivo: Puede ser aplicado desde que el cultivo de trigo y cebada tienen 3 hojas hasta encañazón. Estado de desarrollo de las malezas: Aplicar en post-emergencia de las malezas, entre 3 hojas y comienzo de macollaje. Utilizar la dosis más baja, de 600 cc/ha para malezas en estadios iniciales de crecimiento y la dosis mayor de 800 cc/ha para malezas en comienzo de macollaje. No se recomienda realizar aplicaciones en malezas muy desarrolladas porque no se logran buenos controles.
	Raigras	<i>Lolium multiflorum</i>		

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:

SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINAR LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

Número, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Se realiza una sola aplicación por temporada.

Compatibilidad y fitotoxicidad: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, la efectividad agronómica o la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

No debe ser aplicado si las condiciones climáticas son adversas para el cultivo,



como ocurrencia de heladas, ataques de plaga, deficiencias o exceso hídrico, porque puede ocurrir amarillamiento en el cultivo.
No debe aplicarse más allá de encañazón del cultivo de trigo y cebada.

Tiempo de espera: No corresponde debido al momento de aplicación. Dejar transcurrir 21 días antes de incorporar animales a pastorear o cosechar forraje.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando como mínimo transcurrir 24 h.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Se aplica diluido en agua. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Agregar la cantidad calculada del producto al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento y completar luego el tanque con agua.

Puede ser aplicado con cualquier tipo de equipo terrestre o aéreo.

En aplicaciones terrestres el gasto de agua debe ser entre 120 y 150 L/ha, logrando entre 30 y 40 gotas/cm². Utilizar boquillas de abanico plano y una presión entre 40 y 50 lbs/pulg².

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

En aplicaciones aéreas el gasto de agua debe lograr 30 y 40 gotas/cm².

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas.

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO
IPCS/OMS,2009.-

Antídotos: no tiene antídoto

Primeros auxilios:

En caso de ingestión NO provocar el vómito.

En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua . Quite la ropa contaminada y lávelas antes de volverlas a usar.

En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado, y llevarlo a un

lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.



Franja color azul

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre medidas de protección del ambiente:

No contaminar lagos, ríos, u otra fuente o corriente de agua con restos del producto, o con el lavado del equipo de aplicación

Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico

Toxicidad para peces: ligeramente tóxico ***“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”***

Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase, realice el triple lavado del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina aplicadora. Luego perfora el envase para impedir su reutilización. Traslade los envases al centro de acopio más cercano.

D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.

“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722”.

“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.



Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

“USO AGRICOLA”

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, esta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo	Contenido neto	Material
Botella	1000 mL	COEX - PET
Bidón	5, 10, 20 L	COEX - PET

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma



SIN VALOR COMERCIAL