10 de febrero de 2021

Form. 235	**ETIQUETA APROBADA** **De Producto Fitosanitario*** Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

Nombre: **CHANA F.E**

Clase de uso (aptitud):Herbicida

Tipo de la formulación: Concentrado emulsionable

Composición del producto:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Acetoclor	80.8%	900 gr/l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Cloroacetamida

Número de Registro: ***2693*** Declaro que estará impreso en la etiqueta

Número del lote o partida: Declaro estará datado en el envase o etiqueta

Fecha de fabricación del producto: Declaro estará datado en el envase o etiqueta

Fecha de vencimiento: Declaro estará datada en la etiqueta

Nombre del fabricante o formulador: **JIANGSU TENGLONG BIOLOGICAL & MEDICAL CO.LTD.**

País de origen: China

Nombre y dirección de la firma registrante: SAUDU
Av. República de Corea Nº 2962
Tel 2508/63/22—2508/88/66

Instrucciones de almacenamiento:
Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-veneno (calavera)”.
INFLAMABLE

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

SIN VALOR COMERCIAL

CHANA F.E es un herbicida recomendado para el control en pre-emergencia de malezas gramíneas y hoja ancha. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la división y elongación celular, deteniendo el crecimiento y provocando su muerte de las malezas al ir germinando.

Cultivo	Malezas		Dosis L/há	Momento de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científico		
Maíz *(Zea mays L.)* ***Girasol*** *(Helianthus annuus* L.)	Albahaca silvestre Brachiaria Capíndel arroz Cola de zorro Chinchilla Pata de gallina Panicum Pasto blanco Quinoa Sorgo de alepo Verdolaga Yuyo colorado	*Galisoga parviflora* *Brachiaria platyphilla* *Echinocloa crusgalli* *Setaria viridis* *Tagetes minuta* *Eleusine indica* *Panicum dichotomiflorum* *Digitaria sanguinalis* *Chenopodium album* *Sorgum halepense (de semilla)* *Portulaca oleracea* *Amaranthus reflexus*	Suelos livianos 1,5 a 2,5 Suelos Medios 2,5 a 3,0 Suelos pesados 3,0 a3,8	Aplicar inmediatamente después de la siembra. Aplicar sobre suelo bien preparado (sin terrones), libre de malezas y restos de rastrojo. Para la buena eficacia del producto, el suelo debe estar húmedo. No es necesario cubrir con suelo

Siembra: sembrar el cultivo a una profundidad no menor de 3 cm. Cubrir bien las semillas para evitar el contacto directo con el herbicida.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:

SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Puede mezclarse con Atrazina para mejorar el espectro de control de malezas. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

MODO DE APLICACIÓN: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de CHANA F.E y completar el llenado con agua.

No efectuar el llenado con agua de las maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.-

METODO DE APLICACIÓN: Con equipos terrestres o aéreos

Manejo de la deriva:

Se debe tener especial cuidado en evitar la deriva de la neblina de pulverización fuera del área a tratar. No aplicar con vientos mayores a 10 Km./h., Temperatura del aire mayor a 27°C o humedad relativa menores a 60%.

SIN VALOR COMERCIAL

Resol.s/n de 14/5/2004 y Nº 188 DE 25/3/2011:
No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

Resol. Nº129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)~

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Número y frecuencia de las aplicaciones: una aplicación por ciclo de cultivo.

Tiempo de espera: 45 días. Para la resiembra de otros cultivos diferentes a soja, girasol y maíz, se aconseja esperar un mínimo de tres meses. Se podrá resembrar trigo cuatro meses después de la aplicación.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: **Clase III (tres) LIGERAMENTE PELIGROSO. IPCS-OMS, 2009**

Antídotos: no tiene antídoto.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.
En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada de inmediato lavar las zonas afectadas con abundante agua fresca. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarlas.
En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

FRANJA COLOR AZUL

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
No transportar ni almacenar con alimentos utensilios domésticos y vestimentas.
No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos, lavarse previamente las manos.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Utilizar los equipos de protección indicados para la aplicación y carga de la pulverizadora.

SIN VALOR COMERCIAL

Evitar la ingestión accidental del producto y el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
Evitar respirar la neblina de pulverización.
No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.
No trabajar con fuerte viento y evitar corrientes de aire donde se está pulverizando.
Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del manipuleo y aplicación, así como también la ropa utilizada.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

A)MEDIDAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Aplicaciones foliares

- No producir deriva. Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos , otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua
- La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas.
- Situaciones climáticas que aumenten las posibilidades de ocurrencia. La Empresa aplicadora es la responsable por los daños que se produzcan.

B) PELIGROSIDAD

Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO
Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO
Toxicidad para peces: MUY TOXICO

MEDIDAS DE MITIGACION:

Aplicaciones foliares

No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorecen la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 h de aplicación) o deriva del producto
Prohibida la aplicación a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 m en aplicaciones terrestres y 30 m en aplicaciones aéreas
Evitar la aplicación en surcos de erosión, desagües o áreas que descargan escorrentía en cuerpos de agua adyacentes.

PRODUCTO LIXIVIABLE: no aplicar a suelos con menos de 2% de materia orgánica. No aplicar si se prevén lluvias o riegos abundantes posterior a la aplicación planificada

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Disposición final de envases:
Una vez vaciado el contenido del envase realice el “Triple lavado” del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.

SIN VALOR COMERCIAL

Una vez que el envase esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano.

D	LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA
	“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”
	“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS”
	“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: 1722”
	“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE”
	“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
	“VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA”
	“USO AGRÍCOLA”
	“PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”
	“LEA LA ETIQUETA”

SIN VALOR COMERCIAL

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo----------Capacidad----------Material

Bidón----------5, 10 y 20 l----------HDPE

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) Técnico Asesor, *Ingeniero Agrónomo*

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) Técnico Asesor, *Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación naciona)*

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma

SIN VALOR COMERCIAL