



15 de noviembre de 2016.-

|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórm.<br/>235</b> | <b><u>ETIQUETA APROBADA</u></b><br><b><u>De Producto Fitosanitario*</u></b><br>Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.- |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nombre comercial: <b>TAURUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                       |
| Clase de uso (aptitud): Herbicida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| Tipo de la formulación: Concentrado Soluble (SL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |
| Composición del producto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| Nombre común del ingrediente activo: (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje en peso: | Contenido en volumen: |
| Ciclorama, Sal potásica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 %                | 278 g/L               |
| Equivalente en Picloram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,7 %              | 240 g/L               |
| Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Ácido piridiloxiacético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                       |
| Número de Registro: <b>4459</b> Declaro que estará impreso en la etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                       |
| Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |
| Fecha de fabricación del producto: Declaro que estará impreso en la etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                       |
| Fecha de vencimiento: Declaro que estará impreso en la etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |
| Nombre del fabricante o formulador: SINOCHEM NINGBO LTD. e IPROCHEM (TIANMEN) Co.LTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |
| País de origen: CHINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |
| Nombre y dirección de la firma registrante: Proquimur S.A.<br>Ruta 5 Km 35,700, Canelones, Uruguay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                       |
| Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno" (calavera). |                     |                       |

| <b>B RECOMENDACIONES DE USO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:</u></b> Taurus es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas de hoja ancha. Tiene acción hormonal y es selectivo para trigo, cebada, colza, maíz y sorgo. Es absorbido por el follaje, tallo y raíces de las malezas. Actúa produciendo alteración en el balance hormonal y en la síntesis proteica, provocando detención |

del crecimiento, necrosis y otras alteraciones en el desarrollo de las malezas.

Instrucciones de uso:

| Cultivo | Maleza           |                                    | Dosis           | Momento de Aplicación                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Nombre Común     | Nombre Científico                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TRIGO   | Abrojo grande    | <i>Xanthium cavanillesii</i>       | 75 – 100 cc/ha  | Aplicar desde el comienzo del macollaje hasta el comienzo del encañado. Las malezas deben ser pequeñas, aplicar en estado de roseta, antes de la elongación del vástago. + 2,4 D 48% (Gamina) 750 cc/ha                                          |
|         | Anagallis        | <i>Anagallis arvensis</i>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Capiquí          | <i>Stellaria media</i>             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Cardo pendiente  | <i>Carduus nutans</i>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CEBADA  | Cardo negro      | <i>Cirsium vulgare</i>             |                 | Aplicar desde 1 o 3 hojas del cultivo hasta antes de la emisión del tallo floral. Las malezas deben ser pequeñas y estar en activo crecimiento, en el caso de malezas arrosadas aplicar en estado de roseta, antes de la elongación del vástago. |
|         | Corrihuela       | <i>Convolvulus arvensis</i>        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Cicuta negra     | <i>Ammi majus</i>                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Chamico          | <i>Datura ferox</i>                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Chinchilla       | <i>Tagetes minuta</i>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Enredadera anual | <i>Polygonum convolvulus</i>       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Flor Morada      | <i>Echium plantagineum</i>         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAIZ    | Gambarrusa       | <i>Alternanthera philoxeroides</i> | 100 – 120 cc/ha | Aplicar desde que el cultivo tiene 2 hojas hasta 6 hojas. Las malezas deben ser pequeñas y estar en activo crecimiento, aplicar en estado de roseta, antes de la elongación del vástago. + 2,4 D 48% (Gamina) 750 cc/ha                          |
|         | Quinoa           | <i>Chenopodium album</i>           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Lengua de vaca   | <i>Rumex crispus</i>               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Manzanilla       | <i>Matricaria chamomilla</i>       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Mostacilla       | <i>Rapistrum rugosum</i>           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SORGO   | Sanguinaria      | <i>Polygonum aviculare</i>         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Senecio          | <i>Senecio madagascariensis</i>    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Viznaga          | <i>Ammi visnaga</i>                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Yuyo colorado    | <i>Amaranthus quitensis</i>        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |



### **PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:**

**SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTES MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.**

Momento(s) de aplicación: para cada combinación:

Número, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Se recomienda realizar una aplicación por temporada.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con Gamina (2,4 D). En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, la efectividad agronómica o la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba en pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

No es fitotóxico a las dosis y momentos de desarrollo del cultivo recomendado en la etiqueta.

Tiempo de espera: para cereales 45 días.

Dejar transcurrir 21 días entre la aplicación y el pastoreo.

En caso de rotar con cultivos sensibles como Girasol, Soja, Papa, Hortalizas y otras leguminosas, se debe esperar al menos 70 días desde la aplicación a la implantación del cultivo.

Tiempo de reingreso al cultivo: No reingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado dejando transcurrir al menos 24 hs.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Se aplica diluido en agua. Agregar la cantidad calculada del producto al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento y completar luego el tanque con agua.

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Se recomienda aplicar con equipos pulverizadores terrestres capaces de lograr 30 a 40 gotas/cm<sup>2</sup> calibrando la máquina con un gasto entre 80-120 litros/Ha, y con boquillas de abanico plano trabajando a una presión entre 25 y 40 lbs/pulg<sup>2</sup>.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre

en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

## C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL  
IPCS/OMS 2009

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión NO inducir el vómito.

En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.

En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

**En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722.**



FRANJA COLOR VERDE

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase, realice el triple lavado del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina



aplicadora. Luego perfora el envase para impedir su reutilización y llévelo al centro de acopio más cercano.

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>D</b> | <b>LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA</b> |
|----------|--------------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b><u>“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL:1722”.</u></b> |
|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b><u>“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.</u></b> |
|------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b><u>“USO AGRICOLA”</u></b> |
|------------------------------|

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## NOTA

### Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cuál de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

| Tipo    | Contenido neto      | Material |
|---------|---------------------|----------|
| BOTELLA | 100 – 500 – 1000 cc | PE, COEX |
| BIDON   | 5 – 10 - 20 L       | PE, COEX |

## E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

| Apellidos y nombres completos (1) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |

(1) *Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

| Apellidos y nombres completos (2) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |

(2) *Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

| Apellidos y nombres completos (3) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |