

SULFATO DE POTASIO

GRADO HORTÍCOLA - ELEMENTOS PUROS



Van Iperen Sulfato de Potasio (SOP) Grado Hortícola es un fertilizante de Potasio altamente puro, que se disuelve de forma rápida y completa. Nuestro producto no presenta sensibilidad alguna al apelmazamiento. Se recomienda su uso durante el desarrollo de la fruta o tubérculo hasta la maduración, y también durante la etapa de coloración de los frutos. El alto nivel de Potasio de nuestra fórmula juega un papel esencial para lograr un rendimiento de mayor calidad.

- Mejora la calidad de la fruta, duración y aumenta la resistencia a la sequía de la planta
- Limita el crecimiento vegetativo a partir de la formación de la fruta
- Desarrollado para la fertigación en campo abierto e invernaderos. También apto para aplicación foliar



Composición (%p/p)

Óxido de Potasio	> 51%
Potasio	> 42%
Trióxido de Azufre	> 45%
Azufre	> 18%

Compatibilidad

Compatible con otros fertilizantes, a excepción de fertilizantes de Calcio. Por ello, se requiere de un depósito separado o se deben aplicar los fertilizantes en tiempos diferentes.

Embalaje



Características del Producto

- Bajo en metales pesados
- Bajo en Sodio y Cloruro



Instrucciones de dosificación | Hidroponía

kg en 1000 l solución	K ₂ O en kg	SO ₃ en kg
25	12.7	11.2
50	25.5	22.5
75	38.2	33.7
100	51	45

Las concentraciones mencionadas representan la cantidad de nutrientes en la solución estándar. La concentración final del agua de irrigación depende de la cantidad de nutrientes en la solución estándar, el ratio de inyecciones y la cantidad de nutrientes empleada en el agua.

SULFATO DE POTASIO

GRADO HORTÍCOLA - ELEMENTOS PUROS

Sabías?

¡Van Iperen ofrece una amplia gama de productos de potasio! Nuestra gama de potasio está compuesta de productos líquidos y solubles de alta calidad para aplicación foliar y fertirrigación en cultivos de campo abierto y de alta tecnología sin tierra. Los productos de potasio Van Iperen forman parte de una amplia gama de Fertilizantes Especializados de Iperen.

Donde la Nutrición se encuentra con Biostimulación™

Van Iperen International es un productor holandés de Fertilizantes Especializados. Van Iperen ofrece un amplio rango de fertilizantes que combinan nutrición y bioestimulación. Para obtener más información, por favor póngase en contacto con tu Gerente de Ventas local de Van Iperen o visite nuestra página web:

www.vaniperen.com

Grow for the best.

Instrucciones de dosificación | Fertirrigación

Cultivo	Fecha de aplicación	Min kg/ha/temporada	Max kg/ha/temporada
 Árboles frutales	• A partir de la formación de la fruta • Hasta 4 semanas antes de la cosecha	150	350
 Plátano	• A partir del establecimiento de la planta • Durante el programa completo de fertirrigación	300	500
 Cítricos (adulto)	• A partir de la formación de la fruta • Hasta 4 semanas antes de la cosecha	200	400
 Patata	• A partir de la formación del tubérculo • Hasta el llenado del tubérculo	100	200
 Viñedos (adultos)	• A partir de la apertura del botón floral • Hasta 4 semanas antes de la cosecha	100	250

SULFATO DE POTASIO

GRADO HORTÍCOLA - ELEMENTOS PUROS

Instrucciones de dosificación | Aplicación foliar

Cultivo	Fecha de aplicación	Min kg/ha/appl	Max kg/ha/appl	Conc. % (p/v)
 Árboles frutales	3 - 5 aplicaciones: • A partir de la formación de la fruta • Intervalo de 14 - 21 días	7	10	1.0 - 2.0
 Cítricos	3 - 5 aplicaciones: • A partir de la formación de la fruta • Intervalo de 14 - 21 días	9	12	2.0 - 3.0
 Aceituna	3 - 5 aplicaciones: • A partir de la formación de la fruta • Intervalo de 14 - 21 días	9	12	2.0 - 3.0
 Patata	3 aplicaciones: • A partir de 3 semanas después de plantación • Intervalo de 10 -14 días	4	6	1.0 - 3.0
 Cultivos frondosos	3 aplicaciones: • A partir de 4 semanas después de siembra • Hasta el crecimiento vegetativo • Intervalo de 10 -14 días	5	8	0.5 - 1.0

En caso de Fertilización foliar como parte de una mezcla de productos para la protección del cultivo u otros fertilizantes, debe realizarse una prueba de compatibilidad antes de preparar la mezcla de pulverización.

Dosis y las fases de la aplicación son dadas como guía. Las dosis exactas, la concentración y la etapa de aplicación están sujetos a las condiciones locales, el uso de otros fertilizantes solo pueden realizarse después de un diagnóstico objetivo.