Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

TEXTO DE ETIQUETA CORREGIDO

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: FLOXY PRO		
Clase de uso (aptitud): FUNGICIDA		
Tipo de la formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
PROTIOCONAZOL	16 %	175 g/l
TRIFLOXISTROBIN	14 %	150 g/l
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Triazol + Estrobilurina		
Número de Registro: Declaro que esta información estará impresa en la etiqueta.		
Número del lote o partida: Declaro que esta información estará impresa en la etiqueta.		
Fecha de fabricación del producto (mes y año): Declaro que la fecha de fabricación estará datada en la etiqueta.		
Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años): Declaro que la fecha de vencimiento estará datada en la etiqueta.		
Nombre del fabricante o formulador: 1) Shanghai Agroviva Chemical Co., Ltd. 2) Agro Crown Co., Ltd.		
País de origen: CHINA		
Nombre y dirección de la firma registrante: TAMPA S.A. Camino Carlos A López 7444. Montevideo. Tel. 23213131		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno (calavera)”.		

SIN VALOR COMERCIAL

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

FLOXY PRO es un fungicida que combina ingredientes de dos grupos químicos distintos; estrobilurina + triazol, lo que le confiere excelente control tanto preventivo como curativo. El Trifloxistrobin actúa inhibiendo el proceso de respiración de los hongos, y por su parte el Protioconazol tiene excelente poder curativo sobre un gran espectro de hongos, con acción sistémica.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis
	Nombre Común	Nombre Científico	
Soja (Glycine max L.)	Mancha marrón Tizón de la hoja Roya asiática de la soja	*Septoria glycines* *Cercospora kikuchii* *Phakospora pachyrhizi*	400 cc/ha
Trigo (Triticum aestivum L.)	Sepotriosis de la hoja Roya de la hoja Roya estriada o amarilla	*Septoria tritici* *Puccinia triticina* *Puccinia stritiformis*	700 cc/ha
Cebada (Hordeum vulgare L.)	Mancha en red tipo red Mancha en red tipo spot Escaldadura Roya de la hoja Ramulariosis	*Pyrenophora teres f. sp teres* *Pyrenophora teres f. sp. Maculata* *Rhynchosporium secalis* *Puccinia hordei* *Ramularia collo-cygni*	700 cc/ha

Momento de aplicación:

Trigo y Cebada: Aplicar cuando se den condiciones climáticas para el desarrollo de la enfermedad (en el desarrollo de la caña y hasta terminada la floración).

Soja: Monitorear periódicamente el cultivo. Cuando se observan los primeros síntomas aplicar a todo el cultivo. Si es necesario repetir la aplicación a las 2 a 3 semanas.

Para EFC en soja, el mejor control se obtiene con aplicaciones preventivas a finales de floraciones (R3-R5), prestando atención a los sistemas de alarma existentes y aplicando cuando se registren focos cercanos y existan condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad.

En todos los casos se recomienda aplicar con DUSILAN SP SILICONADO a razón de 25-50 cc/ha dependiendo de las condiciones y el tipo de aplicación para logar los mejores resultados.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Aplicar cómo máximo 2 veces en un mismo ciclo de cultivo, si es que se dan las situaciones indicadas para cada cultivo y dejando transcurrir 2-3 semanas entre una aplicación y otra.

Compatibilidad y fitotoxicidad: No es fitotóxico si se utiliza siguiendo las instrucciones detalladas en ésta etiqueta. Si se quiere mezclar con otro fitosanitario, y se desconoce la compatibilidad de la mezcla, o su eficacia agronómica, se recomienda realizar una aplicación a escala previo a su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: Soja, trigo y cebada: 30 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

SIN VALOR COMERCIAL

Modo de preparación y técnica de aplicación:
Cargar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad. Incorporar la dosis indicada de FLOXY PRO. Completar el volumen de agua manteniendo el agitador en marcha y agregar el DUSILAN SP SILICONADO.
Por Resolución MGAP de fecha 14 de mayo de 2004 se encuentran prohibidas las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, sub urbana y centro poblado. También se encuentran prohibidas las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (Cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana, sub urbana y centro poblado.
Por Resolución MGAP N° 129 de fecha 27 de febrero de 2008 están prohibidas las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). También se encuentran prohibidas las aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Se prohíbe el llenado con agua de las maquinarias de aplicación directamente desde las corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.
Por Resolución MGAP N° 188/011 de 25 de marzo de 2011 se encuentran prohibidas las aplicaciones aéreas y terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivos a menos de 500 metros y 300 metros respectivamente, del límite del predio de los centros educativos.

SIN VALOR COMERCIAL

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: NO provocar el vómito.
En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

La franja de color referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta

Franja color: VERDE CUIDADO

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Medidas Generales para protección del medio ambiente:

- Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de la misma.
- No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua, o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

SIN VALOR COMERCIAL

- La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas..
- No dejar semilla tratada con este producto expuesta a ser consumida por animales domésticas o silvestres, principalmente aves.

Peligrosidad en función de las toxicidades:

A) Toxicidad para peces/organismos acuáticos: **ALTAMENTE TÓXICO.**

Medidas de mitigación: No sembrar en áreas de desagües y surcos de erosión. No sembrar a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 m en aplicaciones terrestres y 30 m aplicaciones aéreas. No lavar las sembradoras en lagos, ríos y otras fuentes de agua, ni en la cercanía de los mismos.

B) Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TÓXICO

C) Toxicidad para abejas**:** VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

D) Toxicidad para organismos de suelo (lombrices): **LIGERAMENTE TÓXICO**

Medidas de mitigación: Aplicaciones foliares: Utilizar solo en cultivos con cobertura foliar o en ambientes controlados donde la deriva al suelo sea mínima.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

SIN VALOR COMERCIAL

D	LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.	
“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722 ”.	
“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.	
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.	
“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.	
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	
“USO AGRICOLA”	
“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.	
“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.”	

SIN VALOR COMERCIAL

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cuál de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo de envase	Contenido neto (lt)	Material
Botella	0,5 – 1,0 – 2,0	Polietileno de alta densidad
Bidón	5 – 10 - 20	Polietileno de alta densidad

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) Técnico Asesor, *Ingeniero Agrónomo*

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) Técnico Asesor, *Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación naciona)*

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma

SIN VALOR COMERCIAL