

29 de enero de 2018

Form. 235	TEXTO DE ETIQUETA CORREGIDO De Producto Fitosanitario* Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-
-----------	--

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: CORAGEN™		
Clase de uso (aptitud): INSECTICIDA		
Tipo de la formulación: Suspensión concentrada		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
CLORANTRANILIPROLE	18,3	200
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Diamidas Antranílicas		
Número de Registro: 3881		
Número del lote o partida: declaro que estará impreso en la etiqueta		
Fecha de fabricación del producto (mes y año): declaro que estará impreso en la etiqueta		
Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años): declaro que estará impreso en la etiqueta		
Nombre del fabricante o formulador: 1-E.I. DuPont de Nemours and Company; 2-DuPont de Nemours S.A.I. Agricultural Products, 3- DuPont Company Pte. Ltd		
País de origen: 1-Estados Unidos, 2-Francia, 3-Singapur		
Nombre y dirección de la firma registrante: FMC Latinoamerica S.A. Colonia 810Of. 403, Montevideo, Uruguay.		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente		

señalizado con un cartel que indique “Cuidado-veneno (calavera)”.

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

CORAGEN™ es un insecticida que posee un nuevo modo de acción, actuando como antagonista (activador) de los receptores de rianodina de los insectos, afectando el proceso de contracción muscular. Los individuos afectados presentan parálisis, letargia, rápidamente dejan de comer y mueren en el transcurso de 1 a 3 días. CORAGEN™ es especialmente efectivo por ingestión de las partes tratadas, aunque también tiene actividad por contacto. CORAGEN™ es adecuado para ser usado en un esquema de Manejo Integrado de Plagas, porque no afecta a los insectos benéficos cuando es usado en las condiciones indicadas en esta etiqueta. Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga (1)		Dosis	Momento de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científico		
Soja	Lagarta del girasol	<i>Rachiplusia nu</i>	25 a 30 cm ³ /ha	Antes de floración: desde 15 orugas mayores a 1,5 cm por metro de surco y mas de 20 % de defoliación. Después floración: desde 10 orugas mayores a 1,5 cm por metro de surco y mas de 10 % de daño al follaje. Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación
	Lagarta de las leguminosas	<i>Anticarsia gemmatilis</i>		
	Lagarta cogollera	<i>Spodoptera frugiperda</i>		
	Lagarta bolillera	<i>Helicoverpa gelotopoeon</i>		Aplicación en estadios vegetativos, mientras las orugas

				están expuestas alimentándose de hojas y brotes. Umrales de 0,5 a 1 oruga por metro de surco
Maíz	Lagarta cogollera	Spodoptera frugiperda	75 a 100 cm3/ha	Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, inmediatamente después de la eclosión de las larvas, cuando se observen los primeros daños (raspaduras). Aplicar cuando las larvas estén en la parte desplegada de las hojas. NO aplicar cuando las larvas hayan ingresado al cogollo. Utilizar las dosis mayores en zonas de alta presión de plaga
APLICAR FUERA DEL PERIODO DE FLORACION DEL CULTIVO Y EN AUSENCIA DE MALEZAS EN FLOR DENTRO Y EN EL AREA CIRCUNDANTE DEL CULTIVO.				
Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Realizar un máximo de 2 aplicaciones por cada ciclo de cultivo				
Compatibilidad y fitotoxicidad: CORAGEN™ es compatible con otros productos recomendados para el cultivo de soja. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. Fitotoxicidad: CORAGEN™ no es fitotóxico para soja o maíz en las dosis y condiciones de aplicación indicadas.				
Tiempo de espera: Soja: 15 días; Maíz: 63 días				

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso

Cualquier información que complete el conocimiento del modelo de uso:

Prevención de Resistencia: se recomienda rotar o combinar con otros insecticidas de diferente modo de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. No realizar más de 2 aplicaciones de insecticidas con el mismo modo de acción por generación de una misma plaga. Si no es posible determinar las generaciones de las plagas con precisión, no realizar más de 2 aplicaciones en un período de 30 días; en las aplicaciones siguientes a ese período, rotar con productos de diferente modo de acción.

Rotación de cultivos: CORAGEN™ no tiene restricciones de rotación de cultivos

Modo de preparación

- 1) Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta aproximadamente 1/3 de su capacidad.
- 2) Agregar directamente al tanque de aplicación la cantidad requerida de CORAGEN™ según dosis y superficie a tratar.
- 3) Mezclar enérgicamente con el agitador hasta dispersar totalmente el producto
- 4) Completar la carga de agua del tanque, y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la total homogenización del caldo.


Preparar únicamente la cantidad necesaria a utilizar para el día. No dejar el producto preparado de un día para el siguiente.

Técnica de aplicación:

CORAGEN™ puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En equipos terrestres se recomienda usar un caudal no menor de 80 – 100 l/ha y en equipos aéreos un caudal mínimo de 10 l/ha. En ambos casos se debe calibrar el equipo de modo tal de lograr una cobertura de 50 - 70 gotas/cm³ de superficie foliar.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.



No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL
IPCS/OMS. 2009

Primeros auxilios:

- En caso de ingestión: **NO** provocar el vómito.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- Contacto con los ojos: Lavado ocular con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2)1722 y concurrir al médico llevando esta etiqueta y el envase o folleto acompañante.

 CUIDADO

La franja de color (VERDE) referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TOXICO Toxicidad para abejas: MODERADAMENTE TOXICO <i>“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”</i> Toxicidad para abejas: PRODUCTO PELIGROSO. La protección de los polinizadores y en particular de la ABEJA es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.
Disposición final de envases. Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA
<u>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMESTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”.</u>
<u>“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722”.</u>
<u>“CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.</u>
<u>“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILLOS, VESTIMENTAS”.</u>
<u>“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.</u>
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
<u>“USO AGRICOLA”</u>
<u>“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.”</u>
<u>“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.</u>

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo	Contenido neto	Material
Frasco	0,250 lts	PET
Botella	1 lts; 3,785lts; 0,946lts; 0,4lts	PET
Tambor	200 lts	PLASTICO

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:



Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma

SIN VALOR COMERCIAL